

12.4. Matice lineárního zobrazení

V příkladu (7) v 12.1 pro každou matici A typu $m \times n$ nad polem P je $f_A: P^n \rightarrow P^m$, $x \mapsto Ax$, lineární zobrazení.

Na druhou stranu, pro každé lineární zobrazení $f: P^n \rightarrow P^m$ existuje jediná matice A taková, že $f = f_A$. Pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ buď e_i i -tý vektor kanonické báze P^n , tedy $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, kde 1 je na i -tém místě. Potom pro libovolné $x = (x^1, \dots, x^n) \in P^n$ platí

$$f(x) = f(x^1 e_1 + \dots + x^n e_n) = x^1 f(e_1) + \dots + x^n f(e_n).$$

Čili pro matici A , jejíž sloupky jsou $f(e_1), \dots, f(e_n)$, platí $f = f_A$.

Obdobně lze libovolnému lineárnímu zobrazení mezi konečněrozměrnými vektorovými prostory přiřadit matici, která toto zobrazení popisuje, a to sice matici reprezentující příslušné lineární zobrazení mezi prostory souřadnic vektorů vzhledem ke zvoleným bázím.

Definice 12.4.1. Buďte U, V vektorové prostory, (u_1, \dots, u_n) báze U a (v_1, \dots, v_m) báze V . Buď $f: U \rightarrow V$ lineární zobrazení. Matice A typu $m \times n$, jejíž i -tý sloupek je tvořen souřadnicemi vektoru $f(u_i) \in V$ v bázi (v_1, \dots, v_m) , se nazývá *matice lineárního zobrazení f vzhledem k bázím (u_1, \dots, u_n) a (v_1, \dots, v_m)* .

Přesněji, A_i^j je j -tá souřadnice obrazu $f(u_i)$ v bázi (v_1, \dots, v_m) . Platí tedy

$$f(u_i) = \sum_j A_i^j v_j.$$

Tvrzení 12.4.1. Buďte U, V vektorové prostory, (u_1, \dots, u_n) báze U , (v_1, \dots, v_m) báze V , $f: U \rightarrow V$ lineární zobrazení, $u \in U$, A matice f , $x = (x^1, \dots, x^n)$ souřadnice u , $y = (y^1, \dots, y^m)$ souřadnice $f(u) \in V$ vzhledem ke zvoleným bázím. Pak

$$y = Ax.$$

Důkaz. Jelikož $u = \sum_i x^i u_i$, tak

$$\begin{aligned} f(u) &= f\left(\sum_i x^i u_i\right) = \sum_i f(x^i u_i) = \sum_i x^i f(u_i) = \sum_i x^i \sum_j A_i^j v_j = \\ &= \sum_j \sum_i x^i A_i^j v_j. \end{aligned}$$

Čili j -tá souřadnice vektoru $f(u)$ v bázi (v_1, \dots, v_m) je $y^j = \sum_i x^i A_i^j = \sum_i A_i^j x^i$, což je právě výsledek získávaný při násobení matic A a x . \square

Příklad. Mějme $\alpha: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$, $f \mapsto f'$. Je to tedy zobrazení z prostoru polynomů stupně nejvýše 2 do prostoru polynomů stupně nejvýše 1, které polynomu přiřazuje jeho derivaci. Ověřte, že se jedná o lineární zobrazení.

V $\mathbb{R}_2[x]$ uvažujme bázi $(1, x, x^2)$ a v $\mathbb{R}_1[x]$ bázi $(1, x)$. Ověřte, že jsou to báze. Najdeme obrazy vektorů báze $(1, x, x^2)$ při zobrazení α a jejich souřadnice v bázi $(1, x)$.

$$\begin{aligned} \alpha(1) &= 0, & \text{souřadnice vektoru } 0 \text{ v bázi } (1, x) \text{ jsou } (0, 0); \\ \alpha(x) &= 1, & \text{souřadnice vektoru } 1 \text{ v bázi } (1, x) \text{ jsou } (1, 0); \\ \alpha(x^2) &= 2x, & \text{souřadnice vektoru } 2x \text{ v bázi } (1, x) \text{ jsou } (0, 2). \end{aligned}$$

Matice zobrazení α vzhledem k bázím $(1, x, x^2)$ a $(1, x)$ tedy je

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Například, $\alpha(3x^2 + 2x + 7) = 6x + 2$. Vektor $3x^2 + 2x + 7$ má v bázi $(1, x, x^2)$ souřadnice $x = (7, 2, 3)$ a vektor $6x + 2$ má v bázi $(1, x)$ souřadnice $y = (2, 6)$. Ověřte. A platí

$$A \cdot x = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} = y \quad \square$$

Příklad. Matice identického zobrazení $\text{id}: U \rightarrow U$, $\text{id}(u) = u$, vzhledem k bázím (e_1, \dots, e_n) a (e'_1, \dots, e'_n) (v tomto pořadí) je matice přechodu od báze (e_1, \dots, e_n) k bázi (e'_1, \dots, e'_n) . \square

Tvrzení 12.4.2. *Budte U, V, W vektorové prostory, (u_1, \dots, u_m) báze U , (v_1, \dots, v_n) báze V , (w_1, \dots, w_p) báze W . Budte $\alpha: U \rightarrow V$, $\beta: V \rightarrow W$ lineární zobrazení. Bud A matice zobrazení α vzhledem k bázím (u_1, \dots, u_m) a (v_1, \dots, v_n) , bud B matice zobrazení β vzhledem k bázím (v_1, \dots, v_n) a (w_1, \dots, w_p) . Potom BA je matice zobrazení $\beta \circ \alpha$ vzhledem k bázím (u_1, \dots, u_m) a (w_1, \dots, w_p) .*

Důkaz. Jelikož $\alpha(u_i) = \sum_j A_i^j v_j$ a $\beta(v_j) = \sum_k B_j^k w_k$, tak

$$\begin{aligned} (\beta \circ \alpha)(u_i) &= \beta(\alpha(u_i)) = \beta\left(\sum_j A_i^j v_j\right) = \sum_j A_i^j \beta(v_j) = \sum_j A_i^j \sum_k B_j^k w_k = \\ &= \sum_{j,k} A_i^j B_j^k w_k = \sum_k \sum_j A_i^j B_j^k w_k = \\ &= \left(\sum_j A_i^j B_j^1\right) w_1 + \dots + \left(\sum_j A_i^j B_j^p\right) w_p. \end{aligned}$$

Čili v k -tém řádku i -tého sloupku matice zobrazení $\beta \circ \alpha$ je $\sum_j A_i^j B_j^k = \sum_j B_j^k A_i^j$, což je totéž, co dostaneme při součinu $B \cdot A$. \square

Tvrzení 12.4.3. *Bud α izomorfismus a A jeho matice vzhledem k nějakým bázím. Pak A je invertibilní a A^{-1} je matice inverzního izomorfismu α^{-1} .*

Důkaz. Bud $\alpha: U \rightarrow V$ a bud B matice lineárního zobrazení $\alpha^{-1}: V \rightarrow U$ vzhledem k příslušným bázím. Matice lineárního zobrazení $\alpha^{-1} \circ \alpha = \text{id}_U$ vzhledem k bázi prostoru U je jednotková matice E a podle předchozího tvrzení je to matice BA . Čili, $BA = E$. Analogicky $AB = E$. \square

Důsledek. *Každá matice přechodu od báze k bázi je invertibilní.*

Důkaz. Podle uvedených definic matice přechodu je totéž co matice identity, což je izomorfismus. \square

Tvrzení 12.4.4. *Bud U vektorový prostor se starou bází (u_1, \dots, u_n) a novou bází (u'_1, \dots, u'_n) , bud Q matice přechodu od staré báze k nové bázi. Bud V vektorový prostor se starou bází (v_1, \dots, v_m) a novou bází (v'_1, \dots, v'_m) , bud R matice přechodu od staré báze k nové bázi. Bud $\alpha: U \rightarrow V$ lineární zobrazení. Bud A matice zobrazení α vzhledem k bázím (u_1, \dots, u_n) a (v_1, \dots, v_m) . Bud A' matice zobrazení α vzhledem k bázím (u'_1, \dots, u'_n) a (v'_1, \dots, v'_m) . Pak*

$$A' = RAQ^{-1}.$$

Důkaz. Situaci můžeme znázornit diagramem

$$\begin{array}{ccc}
 \boxed{\begin{array}{c} \text{U} \\ (u_1, \dots, u_n) \end{array}} & \xrightarrow[\text{A}]{\alpha} & \boxed{\begin{array}{c} \text{V} \\ (v_1, \dots, v_m) \end{array}} \\
 \text{id}_U \downarrow Q & & \text{id}_V \downarrow R \\
 \boxed{\begin{array}{c} \text{U} \\ (u'_1, \dots, u'_n) \end{array}} & \xrightarrow[\text{A}']{\alpha} & \boxed{\begin{array}{c} \text{V} \\ (v'_1, \dots, v'_m) \end{array}}
 \end{array}$$

V rozích stojí vektorové prostory s vyznačenými bázemi, šipky označují lineární zobrazení a jsou u nich uvedeny také matice těchto zobrazení. Platí $\text{id}_V \circ \alpha = \alpha \circ \text{id}_U$ a také $\alpha = \text{id}_V \circ \alpha \circ \text{id}_U^{-1}$. Podle Tvzení 12.4.2 o matici složeného zobrazení potom

$$A'Q = RA \quad \text{a také} \quad A' = RAQ^{-1}. \quad \square$$

Příklad. Mějme $\alpha: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$, $f \mapsto f'$. Je to tedy zobrazení z prostoru polynomů stupně nejvýše 2 do prostoru polynomů stupně nejvýše 1, které polynomu přiřazuje jeho derivaci.

(1) Nejprve uvažujme (staré) báze $(1, x, x^2)$ v $\mathbb{R}_2[x]$ a $(1, x)$ v $\mathbb{R}_1[x]$. Ověřte, že jsou to báze. Najdeme obrazy vektorů báze $(1, x, x^2)$ při zobrazení α a jejich souřadnice v bázi $(1, x)$.

$$\begin{aligned}
 \alpha(1) &= 0, & \text{souřadnice vektoru } 0 \text{ v bázi } (1, x) \text{ jsou } (0, 0); \\
 \alpha(x) &= 1, & \text{souřadnice vektoru } 1 \text{ v bázi } (1, x) \text{ jsou } (1, 0); \\
 \alpha(x^2) &= 2x, & \text{souřadnice vektoru } 2x \text{ v bázi } (1, x) \text{ jsou } (0, 2).
 \end{aligned}$$

Matice zobrazení α vzhledem k bázím $(1, x, x^2)$ a $(1, x)$ tedy je

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(2) Nyní uvažujme (nové) báze $(x^2, x+1, x)$ v $\mathbb{R}_2[x]$ a $(x+1, 1)$ v $\mathbb{R}_1[x]$. Ověřte, že jsou to báze. Najdeme obrazy vektorů báze $(x^2, x+1, x)$ při zobrazení α a jejich souřadnice v bázi $(x+1, 1)$.

$$\begin{aligned}
 \alpha(x^2) &= 2x, & \text{souřadnice vektoru } 2x \text{ v bázi } (x+1, 1) \text{ jsou } (2, -2); \\
 \alpha(x+1) &= 1, & \text{souřadnice vektoru } 1 \text{ v bázi } (x+1, 1) \text{ jsou } (0, 1); \\
 \alpha(x) &= 1, & \text{souřadnice vektoru } 1 \text{ v bázi } (x+1, 1) \text{ jsou } (0, 1).
 \end{aligned}$$

Matice zobrazení α vzhledem k bázím $(x^2, x+1, x)$ a $(x+1, 1)$ tedy je

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Například, $\alpha(3x^2 + 2x + 7) = 6x + 2$. Vektor $3x^2 + 2x + 7$ má staré souřadnice $x = (7, 2, 3)$ a nové souřadnice $x' = (3, 7, -5)$. Vektor $6x + 2$ má staré souřadnice $y = (2, 6)$ a nové souřadnice $y' = (6, -4)$. Ověřte. A platí

$$A_1 \cdot x = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} = y$$

a

$$A_2 \cdot x' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix} = y'.$$

Matice přechodu od staré báze $(1, x, x^2)$ k nové bázi $(x^2, x + 1, x)$ v $\mathbb{R}_2[x]$ je

$$Q_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matice přechodu od staré báze $(1, x)$ k nové bázi $(x + 1, 1)$ v $\mathbb{R}_1[x]$ je

$$Q_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

A platí

$$\begin{aligned} Q_2 \cdot A_1 \cdot Q_3^{-1} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = A_2. \quad \square \end{aligned}$$

12.5. Algebraická struktura na množině lineárních zobrazení

Definice 12.5.1. Budte U, V vektorové prostory nad polem P a $f, g: U \rightarrow V$ zobrazení.

(1) Zobrazení $f + g: U \rightarrow V$, zadané předpisem

$$(f + g)(u) = f(u) + g(u)$$

pro libovolný vektor $u \in U$, se nazývá *součet* zobrazení f a g .

(2) Buď $c \in P$. Zobrazení $cf: U \rightarrow V$, zadané předpisem

$$(cf)(u) = c \cdot f(u)$$

pro libovolný vektor $u \in U$, se nazývá *c-násobek* zobrazení f .

Tvrzení 12.5.1. Budte U, V vektorové prostory nad polem P , $f, g: U \rightarrow V$ lineární zobrazení a $c \in P$. Pak zobrazení $f + g$, cf jsou lineární.

Důkaz. Cvičení. □

Budte U, V vektorové prostory nad polem P . Množinu všech lineárních zobrazení z U do V označme $\text{Hom}_P(U, V)$. Tedy

$$\text{Hom}_P(U, V) = \{f: U \rightarrow V \mid f \text{ je lineární zobrazení nad polem } P\}.$$

Tvrzení 12.5.2. Budte U, V vektorové prostory nad polem P . Pak množina $\text{Hom}_P(U, V)$ s operacemi sčítání zobrazení a násobení zobrazení skalárem je vektorový prostor nad polem P .

Důkaz. Cvičení. □

Tvrzení 12.5.3. Budte U, V vektorové prostory nad polem P , $c \in P$, $f, g: U \rightarrow V$ lineární zobrazení a A, B jejich matice vzhledem ke zvoleným bázím. Pak

(1) $A + B$ je matice lineárního zobrazení $f + g$ vzhledem ke stejným bázím,

(2) cA je matice lineárního zobrazení cf vzhledem ke stejným bázím.

Důkaz. Cvičení. □

Tvrzení 12.5.4. Budte U, V konečněrozměrné vektorové prostory nad polem P , $\dim U = n$ a $\dim V = m$. Pak vektorový prostor $\text{Hom}_P(U, V)$ je izomorfní s prostorem $P^{m \times n}$ všech matic typu $m \times n$ nad polem P .

Důkaz. Tvzení dokážeme tak, že najdeme příslušný izomorfismus. Buďte u báze U , v báze V a $\varphi: \text{Hom}_P(U, V) \rightarrow P^{m \times n}$ zobrazení, které každému lineárnímu zobrazení $f: U \rightarrow V$ přiřadí jeho matici vzhledem k bázím u a v .

Potom φ je bijekce, protože každá matice typu $m \times n$ je maticí právě jednoho lineárního zobrazení $U \rightarrow V$ vzhledem k uvedeným bázím (ověřte podrobně). Navíc, podle předchozího tvrzení φ je lineární, protože matice zobrazení $f + g$ je součet matic jednotlivých zobrazení f a g a matice zobrazení cf je c -násobek matice zobrazení f . \square

Lineární zobrazení $V \rightarrow V$ se nazývá *lineární transformace* vektorového prostoru V nebo také *lineární operátor* na vektorovém prostoru V .

Na množině $\text{Hom}_P(V, V)$ můžeme navíc uvažovat binární operaci \circ skládání lineárních transformací s neutrálním prvkem id_V (množina s asociativní binární operací s neutrálním prvkem se nazývá *monoid*).

Tvrzení 12.5.5. *Buď V vektorový prostor nad polem P . Pak pro libovolná $f, g, h \in \text{Hom}_P(V, V)$ a $c \in P$ platí*

$$\begin{aligned} f \circ (g + h) &= f \circ g + f \circ h, \\ (f + g) \circ h &= f \circ h + g \circ h, \\ f \circ (cg) &= (cf) \circ g = c(f \circ g). \end{aligned}$$

Důkaz. Cvičení. \square

Algebraická struktura, která je současně monoid i vektorový prostor nad polem P a platí pro ni identity uvedené v předchozím tvrzení, se nazývá *asociativní P -algebra*. Tudiž, $\text{Hom}_P(V, V)$ je asociativní P -algebra.

Jiný příklad asociativní P -algebry je množina $P^{n \times n} (= \text{gl}(n, P))$ všech čtvercových matic typu $n \times n$ nad polem P vzhledem k binárním operacím násobení a sčítání matic a k operaci násobení skalárem (ověřte).

Podle předchozích tvrzení v konečněrozměrném případě P -algebra $\text{Hom}_P(V, V)$ je izomorfní P -algebře $\text{gl}(n, P)$.

Pro libovolné celé nezáporné číslo k zavedme lineární transformaci $f^k: V \rightarrow V$ předpisem

$$f^k(v) = \underbrace{f(f(\dots f(v)\dots))}_k \text{ pro libovolné } v \in V, \text{ tj. } f^k = \underbrace{f \circ \dots \circ f}_k.$$

Tedy, $f^0 = \text{id}_V$, $f^1 = f$, $f^2 = f \circ f$ a $f^{n+1} = f \circ f^n$.

Definice 12.5.2. Buď $p = a_m x^m + \dots + a_1 x + a_0 \in P[x]$ polynom. Buď $f: V \rightarrow V$ lineární transformace vektorového prostoru V nad polem P a A čtvercová matice nad polem P . Položme

$$\begin{aligned} p(f) &= a_m f^m + \dots + a_1 f + a_0 \text{id}_V, \\ p(A) &= a_m A^m + \dots + a_1 A + a_0 E, \end{aligned}$$

kde E je jednotková matice stejného rozměru jako matice A .

Říkáme, že lineární transformace $p(f)$, resp. matice $p(A)$ vznikla dosazením lineární transformace f , resp. matice A do polynomu p . Hodnota transformace $p(f)$ ve vektoru $v \in V$ se zapisuje $p(f)(v)$.

Příklad. Nechť $p = x^2 - 2x + 2$. Pak pro libovolnou lineární transformaci $f: V \rightarrow V$ máme $p(f) = f^2 - 2f + 2\text{id}$ a pro libovolný vektor $v \in V$ máme $p(f)(v) = f(f(v)) - 2f(v) + 2v$. \square

Tvrzení 12.5.6. *Buď p polynom a buď A matice lineární transformace f vzhledem k nějaké bázi. Pak $p(A)$ je matice lineární transformace $p(f)$ vzhledem k téže bázi.*

Důkaz. Cvičení. □

Tvrzení 12.5.7. *Budte p, q polynomy. Pro libovolnou lineární transformaci f a libovolnou čtvercovou matici A platí*

$$\begin{aligned} (p+q)(f) &= p(f) + q(f), & (pq)(f) &= p(f) \circ q(f), \\ (p+q)(A) &= p(A) + q(A), & (pq)(A) &= p(A)q(A). \end{aligned}$$

Důkaz. Cvičení. □

Důsledek. *Budte p, q polynomy. Pro libovolnou lineární transformaci f a pro libovolnou čtvercovou matici A platí*

$$p(f) \circ q(f) = q(f) \circ p(f), \quad p(A)q(A) = q(A)p(A)$$

(říkáme, že $p(f)$ a $q(f)$ komutují a $p(A)$ a $q(A)$ komutují).